
Dra. Sandra Cristina Sánchez Solano



CATALOGO DE PRODUCTOS.

El Almacen Quirúrgico

MODERNIDAD Y CALIDAD CERCA DE TI


Stent Traqueobronquial.

Código: ST




Indicaciones:

- Neoplasia traqueal primaria osecundaria.
- Fístula traqueo esofágica.
- Rotura traqueal.
- A continuación de fotorresección láser, crioterapia o electrocauterio, para mantener la apertura de la vía aérea.
- Compresión extrínseca o compromiso de la submucosa.
- Estenosis postintubación.
- Estenosis postraumática.
- Estenosis post infecciosas (tuberculosis, histoplasmosis con fibrosis mediastínica, herpesvirus, difteria).
- Estenosis posinflamatorias: enfermedadde Wegener.
- Traqueo malacia focal: siguiendo a traqueostomía o terapia radiante.
- Traqueo malacia difusa: idiopática, policondritis o síndromede Mounier-Kuhn.
- Tumores traqueales.
- Amiloidosis.
- Compresión dinámica excesiva de la vía aérea.



Referencias		Medidas (mm)		
Translúcido	Radiopaco	Diámetro (D)	Longitud (L)	Pared (W)
ST05	STX05	5	50	0.5
ST06	STX06	6	50	0.5
ST07	STX07	7	50	0.5
ST08	STX08	8	50	0.5
ST09	STX09	9	50	0.5
ST10	STX10	10	20,30,40,50,60,70,80	1
ST11	STX11	11	20,30,40,50,60,70,80	1.1
ST12	STX12	12	20,30,40,50,60,70,80	1.2
ST13	STX13	13	20,30,40,50,60,70,80	1.5
ST14	STX14	14	30,40,50,60,70,80	1.5
ST15	STX15	15	30,40,50,60,70,80	1.5
ST16	STX16	16 1/4	30,40,50,60,70,80	1.5
ST17	STX17	17 1/2	30,40,50,60,70,80	1.5
ST18	STX18	18	40,60,80,100	1.5
ST20	STX20	20	40,60,80,100	1.5



El Almacen Quirúrgico


Stent Bronquial Cónico.

Código: CLASS




Indicaciones

- Neoplasias bronquiales.
- Neoplasias que invaden carina traqueal o sus vertientes.
- Atelectasia inminente.
- Compresión extrínseca.
- Broncomalacia.
- Amiloidosis bronquial.
- Rotura bronquial /li>
- Estenosis bronquial.
- Estenosis postraumática.
- Estenosis post anastomosis bronquial quirúrgica término-terminal.
- Compresión dinámica excesiva de la vía aérea.
- Invasión de bronquios fuentes por carcinoma de esófago.
- Luego de resección endoscópica de metástasis bronquiales.
- A continuación de fotorresección láser, crioterapia o electrocauterio, para mantener la apertura de la vía aérea.
- Estenosis post infecciosas (tuberculosis, histoplasmosis con fibrosis mediastínica, herpesvirus, difteria).



Referencias		Medidas (mm)				
Translúcido	Radiopaco	Longitud (L)	Diámetro mayor (A)	Pared mayor (B)	Pared menor (C)	Diámetro menor (D)
CLASS10-30	CLASSX10-30	30	10	1.1	0.9	9.1
CLASS10-40	CLASSX10-40	40	10	1.1	0.9	8.8
CLASS10-50	CLASSX10-50	50	10	1.1	0.9	8.5
CLASS11-30	CLASSX11-30	30	11	1.1	0.9	9.9
CLASS11-40	CLASSX11-40	40	11	1.1	0.9	9.4
CLASS11-50	CLASSX11-50	50	11	1.1	0.9	9
CLASS12-30	CLASSX12-30	30	12	1.2	1	10.9
CLASS12-40	CLASSX12-40	40	12	1.2	1	10.4
CLASS12-50	CLASSX12-50	50	12	1.2	1	10
CLASS13-30	CLASSX13-30	30	13	1.3	1.1	11.8
CLASS13-40	CLASSX13-40	40	13	1.3	1.1	11.4
CLASS13-50	CLASSX13-50	50	13	1.3	1.1	11
CLASS14-30	CLASSX14-30	30	14	1.4	1.2	12.8
CLASS14-40	CLASSX14-40	40	14	1.4	1.2	12.4
CLASS14-50	CLASSX14-50	50	14	1.4	1.2	12




Stent Estenosis Traqueal.

Stent paraEstenosis Traqueal
Código: SET.




Indicaciones

- Estenosis traqueal simple.
- Estenosis traqueal compleja, extensa.
- Estenosis combinada con malacia o compresión.
- A continuación de fotorresección láser, crioterapia o electrocauterio, para mantener laaperturade la vía aérea.
- Estenosis postinfecciosas (tuberculosis, histoplasmosis con fibrosis mediastínica, herpesvirus, difteria).
- Estenosis post anastomosis traqueal quirúrgica.
- Modificaciones de la arquitectura, deformación, acodamiento (tráqueasenil).
- Compresión extrínseca.



Referencias		Medidas (mm)				
Translúcido	Radiopaco	Diámetro (D)	Longitud (L)	A	B	C
SET12-10	SETX12-10	12	40	10	20	10
SET12-10L	SETX12-10L	12	45	12.5	20	12.5
SET14-12	SETX14-12	14	40	10	20	10
SET14-12L	SETX14-12L	14	45	12.5	20	12.5
SET15-13	SETX15-13	15	40	10	20	10
SET15-13L	SETX15-13L	15	45	12.5	20	12.5
SET16-14	SETX16-14	16	50	14.5	21	14.5
SET16-14L	SETX16-14L	16	55	17	21	17



El Almacen Quirúrgico

Stent Traqueocarinobrónquico (en Y).

Código: SY




Indicaciones:

- Neoplasias traqueales.
- Neoplasia traqueobronquial extensa, con o sin compromiso de carina y/o sus vertientes.
- Neoplasias que afectan a ambos fuentes.
- Carcinoma de esófago con invasión de la vía aérea.
- Fístula traqueoesofágica o traqueocutánea.
- A continuación de fotorresección láser, crioterapia o electrocauterio, para mantener la apertura de la vía aérea.
- Compresión extrínseca o compromiso de la submucosa.
- Estenosistraqueal.
- Estenosistraqueobronquial.
- Traqueobroncomalacia.
- Amiloidosis.
- Compresión dinámica excesiva de la vía aérea.



Referencias		Medidas (mm)				
Translúcido	Radiopaco	Largo traqueal (A)	Largo bronquial (B)	Largo bronquial (C)	Diámetro traqueal (D)	Diámetro bronquial (E)
SY08-6-6	SYX08-6-6	80	40	40	8	6
SY10-8-8	SYX10-8-8	80	40	40	10	8
SY12-10-10	SYX12-10-10	110	50	50	12	10
SY13-11-11	SYX13-11-11	90	50	50	13	11
SY14-11-11	SYX14-11-11	110	50	50	14	11
SY15-12-12	SYX15-12-12	110	50	50	15	12
SY16-13-13	SYX16-13-13	110	50	50	16	13
SY17-13-13	SYX17-13-13	110	50	50	17	13
SY18-14-14	SYX18-14-14	110	50	50	18	14



El Almacen Quirúrgico


Stent Traqueocarinobrónquico (oclusivo).

Código: SYO




Indicaciones:

- Fístula bronco pleural derecha o
- izquierda, de cualquier etiología, con
- o sin requerimiento de ARM.
- Fístula bronco pleural acompañada
- de empiema en pacientes con
- drenaje por tubo y buleau.




Referencias		Medidas (mm)				
Translúcido	Radiopaco	Largo traqueal (A)	Largo bronquial (B)	Largo bronquial (C)	Diámetro traqueal (D)	Diámetro bronquial (E)
SY008-6	SY0X08-6	80	5	40	8	6
SYO10-8	SYOX10-8	80	5	40	10	8
SYO12-10	SYOX12-10	110	5	50	12	10
SYO13-11	SYOX13-11	90	5	50	13	11
SYO14-11	SYOX14-11	110	5	50	14	11
SYO15-12	SYOX15-12	110	5	50	15	12
SYO16-13	SYOX16-11	110	5	50	16	13
SYO17-13	SYOX17-13	110	5	50	17	13
SYO18-14	SYOX18-14	110	5	50	18	14




Stent Subglótico.

Código: SG




Indicaciones:

- Estenosis traqueal próxima a la subglotis
- Todas las indicaciones de los stents traqueales y bronquiales




Referencias		Medidas (mm)		
Translúcido	Radiopaco	Diámetro (D)	Longitud (L)	Pared (W)
SG10-L	SGX10-L	10	30,40,50,60,70,80	1
SG11-L	SGX11-L	11	30,40,50,60,70,80	1.1
SG12-L	SGX12-L	12	30,40,50,60,70,80	1.2
SG13-L	SGX13-L	13	30,40,50,60,70,80	1.5
SG14-L	SGX14-L	14	30,40,50,60,70,80	1.5
SG15-L	SGX15-L	15	30,40,50,60,70,80	1.5
SG16-L	SGX16-L	16	30,40,50,60,70,80	1.5
SG17-L	SGX17-L	17	30,40,50,60,70,80	1.5
SG18-L	SGX18-L	18	40,60,80,100	1.5
SG20-L	SGX20-L	20	40,60,80,100	1.5




Stent Pared Fina.

Stent Traqueobronquial de Pared Fina
Código: HE




Indicaciones:

- Fístula bronco pleural.
- Neoplasia primaria o secundaria traqueal con
- bajo componente compresivo.
- Fístula traqueoesofágica.
- Rotura traqueal.
- A continuación de fotorresección láser,
- crioterapia o electro cauterio, para
- mantener la apertura de la vía aérea.
- Traqueomalacia.



Referencias		Medidas (mm)		
Translúcido	Radiopaco	Diámetro (D)	Longitud (L)	Pared (W)
HE11-L	HEX11-L	11	30,40,50,60,70,80	1
HE12-L	HEX12-L	12	30,40,50,60,70,80	1
HE13-L	HEX13-L	13	30,40,50,60,70,80	1
HE14-L	HEX14-L	14	30,40,50,60,70,80	1
HE15-L	HEX15-L	15	30,40,50,60,70,80	1
HE16-L	HEX16-L	16	30,40,50,60,70,80	1
HE17-L	HEX17-L	17	30,40,50,60,70,80	1
HE18-L	HEX18-L	18	40,60,80,100	1
HE20-L	HEX20-L	20	40,60,80,100	1




Stent alta presión.

Stent Traqueobronquialde Alta Presión.
Código: SAP




Indicaciones:

- Neoplasias traqueales con firme compresión extrínseca.
- Severa compresión traqueal que recidiva luego de la dilatación.
- En reemplazo de un stent clásico que colapsa por compresión extrínseca.



Referencias		Medidas (mm)		
Translúcido	Radiopaco	Diámetro (D)	Longitud (L)	Pared (W)
SAP10-L	SAPX10-L	10	30,40,50,60,70,80	2
SAP11-L	SAPX11-L	11	30,40,50,60,70,80	2
SAP12-L	SAPX12-L	12	30,40,50,60,70,80	2
SAP13-L	SAPX13-L	13	30,40,50,60,70,80	2
SAP14-L	SAPX14-L	14	30,40,50,60,70,80	2
SAP15-L	SAPX15-L	15	30,40,50,60,70,80	2
SAP16-L	SAPX16-L	16	30,40,50,60,70,80	2
SAP17-L	SAPX17-L	17	30,40,50,60,70,80	2
SAP18-L	SAPX18-L	18	40,60,80,100	2
SAP20-L	SAPX20-L	13	40,60,80,100	2



El Almacen Quirúrgico


Stent bronquial con orificio lateral.

Código: ST-LSD




Indicaciones:

- Neoplasias en bronquio fuente
- derecho o en intermedio que no afectan al
- lobular superior.
- Compresión extrínseca que no afectan al lobular superior.



Referencias		Medidas (mm)		
Translúcido	Radiopaco	Diámetro (D)	Longitud (L)	Pared (W)
ST-LSD10-30	ST-LSDX10-30	10	30	1
ST-LSD10-40	ST-LSDX10-40	10	40	1
ST-LSD10-50	ST-LSDX10-50	10	50	1
ST-LSD11-30	ST-LSDX11-30	11	30	1.1
ST-LSD11-40	ST-LSDX11-40	11	40	1.1
ST-LSD11-50	ST-LSDX11-50	11	50	1.1
ST-LSD12-30	ST-LSDX12-30	12	30	1.2
ST-LSD12-40	ST-LSDX12-40	12	40	1.2
ST-LSD12-50	ST-LSDX12-50	12	50	1.2
ST-LSD13-30	ST-LSDX13-30	13	30	1.5
ST-LSD13-40	ST-LSDX13-40	13	40	1.5
ST-LSD13-50	ST-LSDX13-50	13	50	1.5
ST-LSD14-30	ST-LSDX14-30	14	30	1.5
ST-LSD14-40	ST-LSDX14-40	14	40	1.5
ST-LSD14-50	ST-LSDX14-50	14	50	1.5




Stent bronquial cónico con orificio lateral.

Código: CLASS-LSD




Indicaciones:

- Roturabronquial
- Compresiónextrínseca
- Broncomalacia
- Amiloidosisbronquial
- Neoplasiasbronquiales
- Estenosisbronquial
- Atelectasiainminente
- Estenosis postraumática
- Neoplasias en bronquio fuente derecho intermedio que no afectan el lóbulo superior
- Neoplasia que invaden carina traqueal o sus vertientes
- A continuación de fotorresección láser, crioterapia o electrocauterio, para mantener la apertura de la vía aérea
- Estenosis post infecciosas(tuberculosis, histoplasmosis con fibrosis mediastínica, herpesvirus, difteria)
- Estenosis post anastomosis bronquial quirúrgica término-terminal
- Compresión dinámica excesiva de la vía aérea
- Invasión de bronquios fuentes porcarcinoma de esófago
- Luego de resección endoscópica de metástasis bronquiales



Referencias		Medidas (mm)				
Translúcido	Radiopaco	Longitud (L)	Diámetro mayor (A)	Pared mayor (B)	Pared menor (C)	Diámetro menor (D)
CLASS-LSD10-30	CLASS-LSDX10-30	30	10	1.1	0.9	9.1
CLASS-LSD10-40	CLASS-LSDX10-40	40	10	1.1	0.9	8.8
CLASS-LSD10-50	CLASS-LSDX10-50	50	10	1.1	0.9	8.5
CLASS-LSD11-30	CLASS-LSDX11-30	30	11	1.1	0.9	9.9
CLASS-LSD11-40	CLASS-LSDX11-40	40	11	1.1	0.9	9.4
CLASS-LSD11-50	CLASS-LSDX11-50	50	11	1.1	0.9	9
CLASS-LSD12-30	CLASS-LSDX12-30	30	12	1.2	1	10.9
CLASS-LSD12-40	CLASS-LSDX12-40	40	12	1.2	1	10.4
CLASS-LSD12-50	CLASS-LSDX12-50	50	12	1.2	1	10
CLASS-LSD13-30	CLASS-LSDX13-30	30	13	1.3	1.1	11.8
CLASS-LSD13-40	CLASS-LSDX13-40	40	13	1.3	1.1	11.4
CLASS-LSD13-50	CLASS-LSDX13-50	50	13	1.3	1.1	11
CLASS-LSD14-30	CLASS-LSDX14-30	30	14	1.4	1.2	12.8
CLASS-LSD14-40	CLASS-LSDX14-40	40	14	1.4	1.2	12.4
CLASS-LSD14-50	CLASS-LSDX14-50	50	14	1.4	1.2	12




Stent Macizo Oclusivo (3 unidades).


Código: MS03



Indicaciones:


- Fístula bronco pleural.
- Falla de sutura en muñón post resección pulmonar o lobular.
- Tratamiento bronquial oclusivo.
- Hemoptisis






Stent Macizo Oclusivo mediano (3 unidades).

Código: MS03M




Indicaciones:

- Fístula bronco pleural.
- Falla de sutura en muñón post resección pulmonar o lobular.
- Tratamiento bronquial oclusivo.
- Hemoptisis




Referencias	Medidas (mm)	
Radiopaco	Longitud	Anchura Pared
MS810	20	MACIZO
MS911		
MS1012	25	



El Almacen Quirúrgico

Stent Macizo Oclusivo - grande (2 unidades).


Código: MS02



Indicaciones:


- Fístula bronco pleural.
- Falla de sutura en muñón post resección pulmonar o lobular.
- Tratamiento bronquial oclusivo.
- Hemoptisis






Stent Macizo Oclusivo (10 unidades).


Código: MS10



Indicaciones:

- Fístula bronco pleural.
- Falla de sutura en muñón post resección pulmonar olobular.
- Tratamiento bronquial oclusivo.
- Hemoptisis






El Almacen Quirúrgico


Stent Bronquial Cónico.

Stent cónico para bronquios menores
Código: ROLL




Indicaciones:

- Obstrucción total o parcial del bronquio lobular
- inferior con basales indemnes.
- Obstrucción total o parcial del tronco común de
- los basales en lóbulo inferior derecho o izquierdo
- Obstrucción total o parcial del bronquio
- intermedio.
- Combinacióndelosanteriores



Referencias		Medidas (mm)			
Translúcido	Radiopaco	Longitud (L)	Diámetro mayor (A)	Diámetro menor (B)	Pared (C)
ROLL1012	ROLLX1012	25	12	10	1.2
ROLL810	ROLLX810	20	10	8	1.1
ROLL911	ROLLX911	20	11	9	1.1



El Almacen Quirúrgico